

Printemps 2016



TROD INFOS n°3

PUBLICATION PROCHAINE DE L'ARRÊTÉ TROD VHC

À l'occasion de la Journée de lutte contre les hépatites virales, le 25 mai dernier, Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, a mis en avant le rôle des CeGIDD qui «améliorent considérablement la prévention et le dépistage des hépatites». De plus, l'accent a aussi été mis sur les TROD : «c'est tout **l'enjeu des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD)** du VHC pour un dépistage de proximité. Je me suis engagée pour que les associations, au contact quotidien des plus vulnérables, puissent elles aussi réaliser ces tests. C'est désormais chose faite avec la loi de modernisation de notre système de santé. **Les arrêtés permettant l'utilisation de ces tests seront prochainement publiés** ».

Source : social-sante.gouv.fr



TRIPLE DÉPISTAGE TROD VIH-VHC-VHB

L'objectif principal de l'étude ANRS-CUBE était d'évaluer le taux d'acceptabilité et de faisabilité d'une offre de dépistage médicalisée, associative et communautaire recourant à l'usage des **tests rapides VIH, VHB et VHC** suivie d'une offre de vaccination anti-VHB. Les tests utilisés dans le cadre de l'étude : TROD INSTI VIH-1/VIH-2, TOYO VHC et VIKIA HBs Ag avec confirmation des résultats VIH positifs sur buvard.

Au 1^{er} décembre 2015, 3224 consultants uniques ont été inclus parmi trois populations cibles : HSH, usagers de drogue et travailleurs/travailleuses du sexe.

Les principaux résultats concernant les HSH :

- Taux d'**acceptation** de **98,3%**
- 49 ont été dépistés séropositifs (44 en première visite) dont **10 primo-infections** (20,4%) et **19 infections récentes** (38,8%)
- Une proportion importante n'avait jamais eu de test pour le VHB (49%) ou le VHC (61%)

Chez les usagers de drogue, 4 VIH+ et 5 VHC+ ont été dépistés. Cette étude a confirmé la faisabilité du dépistage VIH/VHC/VHB par les TROD hors les murs.

Source : [Etude ANRS-CUBE, présentée par le Pr Pialoux au congrès AFRAVIH 2016](#)

TROD VHB A L'ÉTUDE PAR LA HAS

Un groupe de travail de la HAS se penche, depuis février 2016, sur l'utilisation des TROD VHB dans la stratégie de dépistage de l'hépatite B. Cela est d'autant plus pertinent au vu des derniers chiffres sur cette maladie.

En effet, parmi les personnes de 18 à 80 ans vivant en France métropolitaine, plus de 5 % des personnes migrantes originaires d'Afrique subsaharienne vivent avec une hépatite B contre 0,5 % des personnes d'origine française. On recense environ, au total, **300 000 personnes vivant avec le VHB en France**, dont la moitié l'ignore.

Des tests de dépistage marqués CE sont déjà disponibles en Europe et recherchent l'antigène HBs, un des éléments de l'enveloppe du virus de l'hépatite B. A l'exemple des TROD VIH et VHC, les TROD VHB seront un outil complémentaire et permettront une offre élargie de dépistage.

Source : Seronet.info



Printemps 2016



TROD INFOS n°3

LA SYPHILIS FAIT SON RETOUR EN EUROPE

L'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) a publié un rapport qui alerte sur la forte hausse des cas de syphilis en Europe, notamment due à une forte recrudescence chez la population HSH.

Nos précédentes newsletters faisaient état d'une recrudescence de la syphilis en France, celle-ci s'étend désormais à l'Europe.

En 2014, **24 541 cas de syphilis** (5,1 pour 100 000 habitants) ont été signalés dans les 29 États membres de l'Union Européenne. Avec 11,5 cas pour 100 000 habitants, l'île de Malte est la première concernée. Viennent ensuite la Lituanie (8,7), l'Islande (7,7) et l'Espagne (7,7) ou encore le Royaume-Uni (7,2) et l'Allemagne (7,1).

Le rapport de l'ECDC révèle qu'**un tiers des cas de syphilis rapportés en Europe concerne les plus de 45 ans**. A l'inverse, la proportion de moins de 35 ans infectés diminue au cours de ces dernières années. Par ailleurs, quel que soit la classe d'âge, les hommes sont les premiers touchés. Une tendance masculine due essentiellement à une augmentation du nombre de cas chez les HSH (2/3 des cas).

Source : Pourquoidocteur.fr

QUI UTILISE AUTOTEST VIH ?

Une grande enquête menée en ligne pendant plus de 6 mois par la pharmacie IllicoPharma permet de dresser un premier profil des utilisateurs. Cette étude menée sur 909 utilisateurs révèle que **plus d'un primo-testeur sur 2 ne serait pas allé en centre de dépistage** si l'autotest n'était pas disponible en pharmacie.

SEXE DES ACHETEURS

66% hommes
dont 30% commandent plus d'un autotest



34% femmes
dont 17% commandent plus d'un autotest



L'achat d'un second autotest est destiné pour 38% des cas au partenaire et 62% pour se retester

PREMIER DÉPISTAGE ?

42% déclarent qu'il s'agit d'un **premier dépistage du VIH**



58% avaient déjà effectué un dépistage avant (en moyenne, le **dernier dépistage remontait à 3,5 ans**)

*Parmi eux, **54% ne seraient pas allés en centre de dépistage** si l'autotest n'était pas disponible en pharmacie*

NOTE MOYENNE DE SATISFACTION DONNÉE PAR LES UTILISATEURS



Source : IllicoPharma.com

DÉJÀ DISPONIBLE

INSTI™ Multiplex VIH 1/2 et Syphilis

Évalué par le CNR Syphilis

Point **Syphilis**



Point **VIH**

2 résultats et toujours en 60 secondes